


Choroby przenoszone drogą płciową – klasyfikacja

1. **Choroby bakteryjne**
(rzeżączka, kiła, chlamydia)
2. **Choroby wirusowe**
(opryszczka narządów płciowych, kłykciny końcyste, wirusowe zapalenie wątroby typu B, AIDS)
3. **Choroby pierwotniakowe** (rzesistkowica)
4. **Choroby grzybicze** (kandydoza)




CHLAMYDIA

- Najpopularniejsza choroba przenoszona drogą płciową.
65% przypadków odnotowanych zachorowań dotyczy osób w wieku 15–24 lat.
- Instytut Matki i Dziecka zbadał, że w Polsce chlamydią zakażonych jest 42 tys. nastolatków i blisko 30 tys. młodych kobiet.
- 92% zarażonych kobiet i 54% mężczyzn nie ma żadnych objawów.
- Jeśli objawy występują, to:
 - u kobiet: nienaturalny śluz, pieczenie podczas oddawania moczu, ból w dolnej części brzucha,
 - u mężczyzn: zapalenie cewki moczowej, wydzielina z penisa oraz pieczenie podczas oddawania moczu.



RZEŻĄCZKA

- U większości zarażonych osób nie ma żadnych symptomów, ale i tak przekazują bakterie swoim partnerom seksualnym.
- 76% zakażeń dotyczy osób w wieku 15–29 lat, z najwyższym wskaźnikiem wśród kobiet w wieku 15–19 lat i mężczyzn od 20 do 24 roku życia.
- Rzeżączka znacznie szybciej rozwija się wśród mężczyzn niż wśród kobiet.
- Objawy są podobne do tych, które są opisywane w przypadku chlamydii.
- Jest coraz większy problem z opornością rzeżączki na antybiotykoterapię.



KIŁA/SYFILIS

- Kiła zarażonych jest obecnie 3 razy więcej osób niż wirusem HIV.
- Kiła jest wysoce zaraźliwa.
- Trzy fazy choroby:
 - I – niewielkie bezbolesne owrzodzenie w okolicach narządów płciowych.
Znika po 3–6 tygodniach.
 - II – objawy podobne do grypy: gorączka, ból gardła, powiększone węzły chłonne, ból mięśni i stawów – ustają po 3–12 tygodniach.
 - III – utrata wzroku, wyniszczenie mózgu, paraliż, wyniszczenie skóry, kości i innych narządów, a także śmierć.



Groźne HPV

- Wirus brodawczaka ludzkiego HPV (ang. Human Papilloma Virus) jest uważany za główną przyczynę raka szyjki macicy i raka prącia.
- W Polsce wykrywa się tę chorobę u ok. 3500 kobiet rocznie, połowa z nich umiera.
- Ostatnie badania informują, że wirus ten ma również wpływ na coraz częstsze występowanie nowotworów jamy ustnej, głowy i szyi oraz odbytu.
- Obserwuje się szybki wzrost zachorowań powodowanych przez HPV, szczególnie wśród ludzi młodych, aktywnych seksualnie.
- Szczepionka na HPV zabezpiecza na pięć lat tylko przed 4 typami wirusa z ponad 100 typów wirusa HPV.

Konsekwencje chorób przenoszonych drogą płciową

- Skutki tych chorób są poważne, gdyż prowadzą do niepłodności i niektórych nowotworów u kobiet jak i u mężczyzn.
- Zakażone przez matkę dziecko może przyjść na świat niewidome, z ranami i wrzodami na ciele; może nawet umrzeć wkrótce po urodzeniu.
- Rozpoznanie tych chorób nie zawsze jest proste, gdyż wiele z nich w początkowej fazie nie daje wyraźnych objawów chorobowych.



Aby życie było mądre,
najważniejsza jest troska,
po części o naszą teraźniejszość,
po części o naszą przyszłość,
tak aby jedno nie było
przeszkodą dla drugiego.

Artur Schopenhauer

